

دالوں کی کاشت (سفارشات برائے پیداواری ٹیکنالوجی)

نام فصل	زمین کی تیاری	وقت کاشت	ترقی دادہ اقسام	مقدار تخم فی ایکڑ	طریقہ کاشت	کھادوں کا استعمال	آپاشی	جڑی بوٹیوں کی تلفی	اہم کیڑے	اہم بیماریاں	برداشت
چنا	زرخیز میرا، ہلکی میرا زمین، ریتلی زمین	آپاش علاقے: 20 اکتوبر تا 5 نومبر بارانی علاقے: یکم تا 20 اکتوبر	کرک 1، کرک 2، کرک 3، فخر تھل، چٹان، KC-98، لواعر	آپاش زمین: 25 کلوگرام بارانی زمین: 30 کلوگرام	بذریعہ ڈرل قطاروں کا فاصلہ: 30 سینٹی میٹر پودوں کا فاصلہ: 10 سینٹی میٹر	1 بوری DAP فی ایکڑ بجائی کے وقت	دو دفعہ - پہلا پانی بوائی کے 60 سے 70 دن بعد دوسری دفعہ پانی پھول آنے پر پانی دیں	پہلی گوڈی فصل اگنے کے 30-40 دن بعد 2- دوسری گوڈی 70-80 دن بعد	چنے کی سنڈی، چور کیڑا، سست تیلہ، ٹوکا، ٹاڈ کی سنڈی، دیمک، لشکری سنڈی	چنے کا جھلساؤ، مرجھاؤ جڑ کی سڑن، تنے کا گلاؤ -	1- پھلیاں صحیح پکی ہوں 2- کٹائی علی الصبح کریں 3- دیر سے کٹائی نقصان کا اندیشہ ہے۔
مسور	زرخیز میرا، ہلکی میرا زمین	1 یا 2 دفعہ ہل + سہاگہ	مسور 93، ڈیرہ مسور، لوکل مسور، مسور 2004	کم زرخیز زمین: 10 تا 12 کلوگرام زرخیز زمین: 8 تا 10 کلوگرام	بذریعہ کیر ایڈرل: قطاروں میں قطاروں کا فاصلہ: 25 سینٹی میٹر پودوں کا درمیانی فاصلہ: 10 سینٹی میٹر	1 بوری DAP	دو دفعہ پھول نکلنے سے پہلے پھلیاں بننے کے وقت	1- فصل اگنے کے 25 دن بعد 2- پھول بننے کے وقت	ٹاڈ کی سنڈی، ٹوکا، سست تیلہ، لشکری سنڈی، دیمک	تنے کا سڑن، مرجھاؤ جھلساؤ، کنگھی،	1- جب پودے کارنگ سبز سے زرد ہو جائے۔ 2- پودے ہلانے سے پھلیوں سے دانے کی آواز آجائے۔ 3- خشک کرنے کے بعد گہائی کریں۔
لوبیا	میرا زمین، چکنی میرا زمین	2 بار ہل + سہاگہ	سوات کولت 1-2، وائٹ سٹار، CPN-Z، روان 2003، CP-145، CP-113، CP-103	چھوٹے بچ کیلئے: 10-12 کلوگرام موٹے بچ کیلئے: 14 تا 15 کلوگرام	قطاروں میں قطاروں کا فاصلہ: ڈیڑھ فٹ پودوں کا فاصلہ 6 انچ	1 بوری DAP یا 1 بوری ٹریپل سپر فاسفیٹ 1/2 بوری یوریا	1- بوائی کے 3 سے 4 دن بعد 2- پھول آنے پر 3- پھلیوں میں دانے بننے وقت	1- گوڈی 3 ہفتے بعد 2- گوڈی پھول بننے کے وقت	تیلہ، تنے اور پھلی کی سنڈی، چور کیڑا	موزیک اور پتوں کا جھلساؤ سفید پھپھوندی	1- 60 سے 70 فیصد پھلیاں پیلے رنگ کی ہو جائیں۔ 2- پتے مرجھا کر مرنا شروع کر دیں۔ 3- خشک کرنے کے بعد گہائی کریں۔
ماش	درمیانے درجے کی میرا یا زرخیز زمین	آپاش علاقے: 1 یا 2 مرتبہ ہل + سہاگہ بارانی علاقے: بارش کے بعد ایک بار مٹی پلٹنے والا ہل + 2 مرتبہ عام ہل + سہاگہ	چکوال ماش، ماش 97، ماش عروج 2011، ماش 80، ماش 68، ماش 48، دیسی ماش، این اے آر سی 1، این اے آر سی 2	بارانی علاقے: 8 کلوگرام آپاش علاقے: 10 کلوگرام	بذریعہ ڈرل قطاروں کا فاصلہ: 1 فٹ پودوں کا درمیانی فاصلہ: 10-8 سینٹی میٹر زیادہ بارش والے علاقوں میں کھیلوں پر کاشت کریں۔	1 بوری DAP + 1/2 بوری پوٹاشیم سلفیٹ	1- اگاؤ کے تین ہفتے بعد 2- پھول نکلنے کے پر 3- دانہ پھلیاں بننے پر	پہلی گوڈی بوائی کے 25 تا 30 دن کے اندر دوسری گوڈی پہلی آپاشی کے بعد وتر آنے پر۔ بوائی کے فوراً بعد تروترو میں جڑی بوٹی مار زہر سپرے کریں۔	سفید مکھی، تیلہ، ٹوکا، لشکری سنڈی، دیمک، بالدار سنڈی تھرپس	زرد رنگ کی چتری بھورے رنگ کی دھبوں والی بیماریاں، پودوں کا مرجھاؤ، تنے اور جڑوں کا گلنا، تنے کی سرائنڈ۔	80-90 فیصد پھلیاں پک جائیں۔ فصل کو علی الصبح کاٹیں۔ خشک کرنے کے بعد گہائی کریں۔
مونگ	ریتلی میرا، بھاری میرا	2 دفعہ ہل + سہاگہ	کرک مونگ 1، NM-92-98-206، انقلاب مونگ، سونا مونگ، ڈیرہ مونگ، چکوال مونگ 97، سوات مونگ	10-8 کلوگرام فی ایکڑ	بذریعہ ڈرل قطاروں میں کاشت کریں۔ پودوں کا درمیانی فاصلہ 8-10 سینٹی میٹر	ڈھیرانی کھاد: 400 کلوگرام فی ایکڑ قبل از کاشت: 1 بوری DAP + آدھی بوری پوٹاشیم سلفیٹ	1- بوائی کے 3 سے 4 ہفتے بعد 2- پھول آنے پر 3- پھلیوں میں دانے بننے وقت	1- بوائی کے 25-30 دن کے اندر گوڈی کریں 2- پھول آنے سے پہلے گوڈی ضرور کریں۔	تیلہ، سفید مکھی، تھرپس	زرد چتری، بھورے رنگ کے دھبوں کی بیماری	1- 80-90 فیصد پھلیاں پک جائیں۔ 2- خشک کرنے کے بعد گہائی کریں۔