

رسوں اُکائیں خوردنی تیل کی پیداوار بڑھائیں



وزیر اعظم پاکستان کا ذریعی ایمیر جنسی پروگرام تیلدار ارجمناس کی پیداوار میں اضافہ کا قومی منصوبہ

کھاد کا استعمال:

وقت کاشت: 15 ستمبر تا 13 اکتوبر پھاڑی علاقہ جات:

1 بوری یوریا + $\frac{1}{4}$ بوری SSP فی ایکٹر، بارانی علاقوں میں تمام کھاد ز میں کی تیاری کے وقت دیں۔ نہری علاقوں میں نصف کھاد دوسرے پانی کے ساتھ ڈالیں۔

طریقہ کاشت: کاشت بذریعہ ڈرل
قطاروں کا فاصلہ: ایک فٹ
نیچ کی گہرائی $1\frac{1}{2}$ -1-1 انج رکھیں۔

کاشت بذر یا چھپہ:

ڈرل نہ ہونے کی صورت میں کاشت بذریعہ چھٹے کریں۔

شرح نجح:

قطاروں میں بوائی کی صورت میں 2 تا $\frac{1}{2}$ 2 کلوگرام
چھٹے سے بوائی کی صورت میں 3 کلوگرام۔

ترقی داده اقسام:

نیفا، نیفا گولڈ، اباسین 95، روہی سرسوں، در نیفا،
حسینیں 223، ظہور، اسلام

جب پودے چار پتے نکال لیں تو کمزور پودے اُکھاڑ لیں۔ پودوں کا درمیانی فاصلہ 6-14 انج رکھیں۔ چھدرائی پہلا پانی لگانے سے پہلے مکمل کریں۔

ز میں کا انتخاب:

مسرسوں کی کاشت کیلئے بھاری
میرا زمین کا انتخاب کریں۔

زمین کی تاری

ابدأ في عالم القراءة

بادریں مدد کے بات .
برسات سے پہلے ایک مرتبہ
گھر اہل چلا میں تاکہ وتر محفوظ
ہو جائے۔ موسم برسات کے
بعدز میں میں ہل نہ چلایا جائے
صرف کاشت کے وقت ہل کا اہل
چلا کر سہا گہ دے دیں۔

۲۔ مرتبہ مل چلا میں۔
۳۔ مرتبہ مل چلا کر سہا گہدیں۔

پیداواری ٹیکنالو جی




جری بوٹیوں کی تلفی:

غیر کیمیائی طریقہ: پہلی گودی پہلا پانی لگانے سے پہلے دوسری گودی پہلا پانی لگانے کے بعد وتر آنے پر کریں۔
کیمیائی طریقہ: بوائی مکمل کرنے کے بعد وتر میں محلہ زراعت کے مشورے سے جڑی بوٹی مارز ہر سپرے کریں۔



ضرر سال کیڑے اور ان کا انسداد:

سرسou کی آر امکھی، ملی گب، سرسou کا سست تیلہ، گوبھی کی تلی
ضرر رساں کیڑوں کے انسداد کے لیے کیڑے مار زہر کا اسپرے
محکمہ زراعت کے عملے کے مشورے سے کریں یا کال سنٹر نمبر
0348-1117070 پر رابطہ کریں۔



برداشت: سرسوں کی تمام دستیاب اقسام 160 سے 190 دن میں پک کر تیار ہو جاتی ہیں۔ برداشت اس وقت شروع کریں جب پھلیوں کا رنگ بھورا ہونا شروع ہو جائے۔ 30-40 فیصد پھلیاں بھوری ہونے کی صورت میں فصل کو کاٹ دیں۔ کٹائی کے فوراً بعد فصل کو 4-5 دن دھوپ میں رکھ کر خشک کریں۔

نیچ کا ذخیرہ: گہائی سے نیچ نکالنے کے بعد ہوا میں اڑا کر صاف کر دیں اور بوریوں میں بھرنے سے پہلے اچھی طرح خشک کر لیں۔ نیچ میں نمی کی مقدار 8 فیصد سے زیادہ نہ ہو۔



تیلدار ارجمناس کی کاشت پر سبستدی کی فراہمی،

زری آلات پرسپکٹوی کی فراہمی

نمائشی پلات کا قیام