

خیبر پختونخوا میں چارہ جات کی کاشت

(زرعی سفارشات برائے پیداواری ٹیکنالوجی)

نام فصل	زمین کی تیاری	وقت کاشت	ترقی دادہ اقسام	مقدار تخم فی ایکڑ	طریقہ کاشت	کھادوں کا استعمال فی ایکڑ	آپاشی	نقصان دہ کیڑے اور بیماریاں	کٹائی	پیداوار
برسیم	بھاری میرا زمین تین تا چار مرتبہ بل + سہاگہ	وسط ستمبر تا وسط اکتوبر	پشاور، چغتائی، انمول، سپر برسیم، لیٹ فیصل آباد	چھ تا آٹھ کلوگرام	1. بذریعہ جھٹھ 2. بذریعہ ڈرل لائٹوں میں ایک فٹ کے فاصلے پر	پانچ تا چھ ٹرائی گوبر کی گلی سڑی کھاد یا دو بوری DAP یا چار بوری SOP + ایک بوری یوریا اور ہر کٹائی کے بعد یوریا ڈالیں۔	دس تا پندرہ آپاشیاں۔ پہلے دو پانی سات دن کے وقفے سے بعد میں حسب ضرورت بذریعہ ڈرل کاشت فصل کو پہلا پانی تین ہفتے بعد دیں۔	لشکری سنڈی، جڑ کا کیڑا یا گلاؤ، سنے کا گلاؤ، آفٹر اکنوز، برسیم کا سڑنا	زمین سے نوچھ تا نوچھ اونچ کرئیں کٹائی میں ہفتہ ایک تا دو ماہ	پینتیس تا چالیس ٹن فی ایکڑ، زیادہ سے زیادہ پچاس ٹن فی ایکڑ تک حاصل کی جاسکتی ہے۔
لوسرن	زرخیز میرا زمین، ایک دفعہ مٹی پلٹنے والا بل، چار دفعہ دیسی بل، کلیوٹیٹر	اکتوبر تا نومبر	سرگودھا لوسرن	چار تا چھ کلوگرام	بذریعہ ڈرل، بذریعہ جھٹھ	ڈیڑھ بوری DAP + آدھی بوری یوریا یا دو بوری نائٹرو فاس + ڈیڑھ بوری ہر کٹائی کے بعد یوریا SSP ڈالیں	پہلا پانی: تین ہفتے بعد، باقی حسب ضرورت موسم گرما: پندرہ تا تیس دن کے وقفے سے پانی دیں۔	لشکری سنڈی، جیلیہ	بیج والی فصل کے لئے زوری کے بعد پانی بندر کردیں اور جون میں کریں۔ بوئی کے تین ماہ بعد پہلی کٹائی کریں۔ باقی کٹائی ایک ماہ کے وقفے سے کریں۔	تیس تا چالیس ٹن فی ایکڑ
جئی	زرخیز + بھاری میرا زمین مٹی پلٹنے والا بل + تین مرتبہ دیسی بل + سہاگہ بارانی علاقہ: موسم برسات سے پہلے گہرا بل + بارش کے بعد بل + سہاگہ	پندرہ اکتوبر تا تیس نومبر	PD-2، ایل وی 65، ایس 2000، NARC Oat	پینتیس کلوگرام چالیس کلوگرام	بذریعہ جھٹھ، بذریعہ ڈرل لائٹوں میں ایک فٹ فاصلہ	ایک بوری DAP + ایک بوری یوریا	تین تا چار پانی پہلا پانی بوئی کے تین ہفتے بعد، باقی حسب ضرورت بیج والی فصل کو پھول نکلنے کے بعد پانی نہ لگائیں۔	لشکری سنڈی، سنے کی کانگاری	پہلی کٹائی کاشت کے ستر تا اسی دن بعد کریں جب پچاس فیصد نکل آئیں دوسری کٹائی کاشت کے سونتا ایک سو دن دن بعد کریں۔	صحت سوجا آٹھ سو ٹن فی ایکڑ سبز چارہ، چھپیس ٹن فی ایکڑ
جوار یا چرکی	بھاری میرا زمین۔ تین تا چار مرتبہ بل + سہاگہ	مارچ تا اگست	جے ایس 2002، جے ایس 263، جوار 2011	تین تا پینتیس کلوگرام تیس تا پینتیس کلوگرام پانچ والی فصل: آٹھ تا دس کلوگرام	بذریعہ ڈرل، قطاروں کا فاصلہ: ایک فٹ بیج والی فصل کیلئے فاصلہ دو فٹ رکھیں۔	چارہ فصل: دو بوری نائٹرو فاس یا ایک بوری DAP + آدھی بوری یوریا بیج والی فصل: ایک بوری DAP + ایک بوری پوناش	دو تا تین پانی پہلا پانی: بوئی کے تین ہفتے بعد	کوئل کی مکھی، جیلیہ، سنے کی سنڈی، مائٹس، ریڈ لیف سپاٹ، کانگاری	بہاریہ کاشت فصل کی کٹائی: مٹی تا جون خراس کاشت فصل کی کٹائی: اکتوبر تا نومبر بیج والی فصل ماہ نومبر میں تیار ہو جائے تو سٹ کٹ کر خشک کر لیں۔	28 سے 32 ٹن فی ایکڑ بارانی علاقہ جات: 18 تا 20 ٹن فی ایکڑ
باجرہ	ہلکی میرا زمین بل + سہاگہ	مارچ تا اگست	کپازت، پی ایس 2002، سرگودھا باجرہ 2011	چھ کلوگرام بارانی علاقہ جات: آٹھ کلوگرام غله حاصل کرنے کیلئے: تین تا چار کلوگرام	بذریعہ کیڑا ڈرل لاٹھوں کا فاصلہ ایک فٹ	ایک بوری DAP + آدھی بوری یوریا آدھی بوری یوریا جب فصل ڈیڑھ تا دو فٹ ہو جائے۔	پہلا پانی کاشت کے تین ہفتے بعد دیں بعد میں حسب ضرورت پانی دیں۔	شوٹ فلائی، سنے کی سنڈی، گراس پاپر	چارہ فصل اڑھائی ماہ میں تیار ہو جاتی ہے بیج والی فصل کیلئے سولہ ماہ کریں جب فصل میں پچاس فیصد نکل آئیں۔	سبز چارہ: بارانی علاقہ جات: آٹھ تا دس ٹن فی ایکڑ نہری علاقہ جات: تیس تا پینتیس ٹن فی ایکڑ بیج فصل: آٹھ تا دس ٹن فی ایکڑ
مکئی پٹو چارہ	بھاری میرا زمین دو تا تین بار بل + سہاگہ	مارچ تا ستمبر	سرحد واٹ، سلطان، سرگودھا 2002	پینتیس تا چالیس کلوگرام پندرہ تا تیس کلوگرام	بذریعہ ڈرل لائٹوں کا فاصلہ ایک فٹ بیج کی گہرائی: ڈیڑھ تا ڈھائی انچ	ایک بوری DAP + ایک بوری یوریا بعد میں یوریا حسب ضرورت ڈالیں	چار تا چھ پانی پہلا پانی بوئی کے تین ہفتے بعد دیں حسب ضرورت	سنے کی سنڈی، کوئل کی مکھی، چست اور ست تیلہ، سنے کا گلنا سڑنا	بہاریہ کاشت فصل کی کٹائی مئی میں شروع کریں، جولائی کاشت فصل کی کٹائی ستمبر کے دوسرے ہفتے میں شروع کریں، چارہ فصل پینتیس تا چالیس فیصد پھول نکلنے پر کاٹیں۔	پچیس سے تیس ٹن فی ایکڑ
سدا بہار	بھاری میرا زمین دو تا تین بار بل + سہاگہ	کیم تا وسط مارچ	شاہ تاج، این اے آری ایس ایس باسیرڈ، میٹھا سدا بہار، بھیکا سدا بہار، پاک سوڈکس	دس تا بارہ کلوگرام	بذریعہ ڈرل لائٹوں کا فاصلہ ڈیڑھ فٹ	دو بوری نائٹرو فاس، ہر کٹائی کے بعد ایک بوری یوریا ڈالیں	چھ تا سات پانی، پہلا پانی بوئی کے تین ہفتے بعد دیں اس کے بعد حسب ضرورت دیں۔	سنے کی سنڈی، کوئل کی مکھی، جیلیہ	پہلی کٹائی ڈھائی ماہ بعد کریں، پچاس فیصد نکلنے پر کٹائی کریں، دو کٹائیوں کے درمیان ڈیڑھ ماہ کا دورانیہ برقرار رکھیں۔	پچاس تا ساٹھ ٹن فی ایکڑ
گوارہ	رہتی ہلکی میرا زمین وسط اپریل تا یکم مئی بیج فصل: جولائی	اپریل تا جولائی سبز کھاد: وسط اپریل تا یکم مئی بیج فصل: جولائی	بی آزی 99، بی آزی 2017، بی آزی 90، بروکس، کلسٹر ٹائپ،	چارہ فصل: تیس تا پچیس کلوگرام بیج فصل: بارہ تا پندرہ کلوگرام	بذریعہ جھٹھ، کیرا لائٹوں کا فاصلہ ایک فٹ	ایک بوری DAP	دو پانی پہلا پانی: اگڑے کے تین ہفتے بعد دوسرا پانی: پھول نکلنے پر	تیلہ، سوکا	پہلی کٹائی بوئی کے دو ماہ بعد کریں، چارہ والی فصل کی کٹائی پھول نکلنے پر یا پھلیاں نکلنے وقت کریں۔ بیج فصل: جب اسی فیصد پھلیاں بھورے رنگ کی ہو جائیں۔	چارہ کی پیداوار: بارانی علاقہ: سات تا آٹھ ٹن فی ایکڑ آپاش علاقہ: دس تا بارہ ٹن فی ایکڑ بیج والی فصل: بارانی علاقہ: دس تا بارہ ٹن فی ایکڑ آپاش علاقہ: پندرہ تا تیس ٹن فی ایکڑ
مٹ گراس	بھاری میرا، ہلکی میرا، مٹی پلٹنے والا بل + تین مرتبہ عام بل + سہاگہ	فروری تا مارچ جولائی تا اگست	مات، مات ڈوارف، ایلیفٹ گراس، ملائم	پانچ ہزار قلمیں یا جڑیں فی ایکڑ	بذریعہ قلم لائٹوں کا فاصلہ ڈیڑھ تا تین فٹ بذریعہ جڑ	ایک بوری DAP + آدھی بوری یوریا ایک بوری یوریا ہر کٹائی کے بعد	پہلا پانی بوئی کے فوراً بعد دیں ہر ہفتے کے بعد حسب ضرورت پانی لگائیں۔	اچھی تک کوئی خاص کیڑے کوڑے یا بیماری رپورٹ نہیں ہوئی۔	پہلی کٹائی بوئی کے تین تا چار ماہ بعد کریں اس کے بعد کٹائیوں کے درمیان ڈیڑھ تا دو ماہ کا دورانیہ رکھیں۔	اسی تا سولہ سبز چارہ فی ایکڑ
رواں	زرخیز میرا زمین، رہتی، چکتی مٹی دو تا تین بار بل + سہاگہ	مارچ تا جولائی	رواں 2003	چارہ فصل: پندرہ تا تیس کلوگرام بیج فصل: دس تا بارہ کلوگرام	بذریعہ جھٹھ، بذریعہ ڈرل یا کیرا لائٹوں کا فاصلہ دو تا ڈیڑھ فٹ	دو تا تین پانی پہلا پانی: بوئی کے تین ہفتے بعد بعد ازاں حسب ضرورت	لشکری سنڈی، جیلیہ، تھرپس، پرندے، چوہے	مارچ کاشت فصل: جمی جولائی کاشت فصل: جولائی بوئی کے دو تا ڈھائی ماہ بعد فصل کاشت کیلئے تیار ہو جاتی ہے۔	تیس تا پچیس ٹن فی ایکڑ	
روڈ گراس	بھاری میرا زمین تین تا چار بار بل + سہاگہ	آپاش علاقہ: شروع مارچ بارانی علاقہ: جون جولائی بذریعہ قلم: فروری تا مارچ بذریعہ جڑ: جولائی اگست	پائپر، کلمبر، فائن کٹ، ٹاپ کٹ، کیلائیڈ	پانچ تا آٹھ کلوگرام گیارہ ہزار تا بارہ ہزار قلمیں فی ایکڑ	بیج: بذریعہ جھٹھ، بذریعہ ڈرل لائٹوں کا فاصلہ ایک فٹ جڑ یا قلم: فاصلہ دو فٹ	بوقت کاشت: ایک بوری DAP + آدھی بوری یوریا یا دو بوری نائٹرو فاس ہر کٹائی کے بعد ایک بوری یوریا	پہلا پانی: بوئی کے تین تا پانچ دن بعد اس کے بعد حسب ضرورت پانی دیں	چیونیاں اور لشکری سنڈی چیونیاں اس کے تخم کو چرا لیتی ہیں۔	پانچ من بیج فی ایکڑ بہتر گھمراہت سے ایک ہزار من فی ایکڑ تک سبز چارہ حاصل ہو سکتا ہے۔	
جنتر	ہلکی میرا زمین دو تا تین بار بل + سہاگہ	وسط مارچ تا اگست	وائیٹ سینیٹا، ریڈ سینیٹا	چارہ فصل: تیس تا پچیس کلوگرام بیج فصل: دس تا بارہ کلوگرام	حالت وتر میں بذریعہ جھٹھ، لائٹوں کا فاصلہ: چارہ کیلئے ایک فٹ جبکہ بیج کیلئے ڈیڑھ تا دو فٹ کا فاصلہ رکھیں۔	ایک بوری DAP فی ایکڑ بوقت کاشت	پہلا پانی بوئی کے اٹھارہ تا تیس دن بعد لگائیں۔	سبز چارہ: اسی دن بعد پچاس فیصد پھول نکلنے پر کٹائی کریں۔ بیج فصل: ایک سو تیس دن بعد پھلیاں پکنے پر کاٹیں۔	سبز چارہ	