

# تیل دار فصلات کی کاشت

## سفارشات برائے جدید پیداواری ٹیکنالوجی



نام فصل	زمین کی تیاری	وقت کاشت	ترقی دادہ اقسام	مقدار تخم فی ایکڑ	طریقہ کاشت	کھادوں کا استعمال فی ایکڑ	جڑی بوٹیوں کا تدارک	اہم کیڑے	اہم بیماریاں	برداشت	ذخیرہ کرنا
<b>سرسوں</b>	نہری علاقہ جات: دومرتیل + سہاگہ + پانی وتر آنے پر دومرتیل + سہاگہ بارانی علاقہ جات: بارش کے بعد مل + سہاگہ دیں	پہاڑی علاقے: 15 ستمبر تا 13 اکتوبر میدانی علاقے: 13 تا 1 اکتوبر	ابالین 95، درنیفا، نیفارایا، نیفا گولڈ، حسنین 2013، ظہور، اسلام	قطار: ۲ کلوگرام چھٹا: ۳ کلوگرام	قطاروں کا فاصلہ: 40 تا 30 سینٹی میٹر پودوں کا فاصلہ: ۵ تا ۳ سینٹی میٹر بیج کی گہرائی: ۳ تا ۲ سینٹی میٹر	بوقت کاشت: 1 بوری DAP + 0.5 بوری یوریا 0.5 بوری یوریا پھول کھلنے سے پہلے	پہلا پانی: 45 تا 30 دن بعد دوسرا پانی: خشک ہونے پر تیسرا پانی: پھول آنے پر چوتھا پانی: تخم بننے پر	گوکھی سنڈی، لشکری سنڈی، ست تیلہ، چست تیلہ، ملی بگ سرسوں کی آراکھی،	جراثیمی جھلساؤ، سفید کنگھی سننے کا گلنا یا جھلساؤ، سفونی چھوہندی	30 تا 40 فی صد تخم کا رنگ بھورا ہو۔ دھوپ میں خشک۔	نمی کا تناسب 8 فی صد۔ گوداموں کی دھونی کریں۔
<b>سورج مکھی</b>	بھاری میرا زمین۔ 1 گہرا مل + کلٹیوٹر + سہاگہ۔ ہموار کھیت	بھاری: فروری تا وسط مارچ خزاں: یکم جولائی تا 15 اگست	پارک E-92، پشاور 93، ہائی سن 33، ہائی سن 37، سوات، ترنا ب 1، ترنا ب 2، سن کم 92، سن کم 110، نور	ہاہرڈ: 2-2.5 کلوگرام عام اقسام: 4 کلوگرام	پلائٹر + رجر قطاروں کا فاصلہ: 2 تا 2.5 فٹ پودوں کا فاصلہ 9 تا 10 انچ بیج کی گہرائی: 2 انچ	1 بوری DAP + 1 بوری پوناش + آدھی بوری یوریا بوقت کاشت۔ ایک بوری یوریا پھول نکلنے سے پہلے	پہلا پانی: 30 دن بعد دوسرا: ڈوڈیاں بننے وقت۔ تیسرا: پھول کھلنے وقت چوتھا: بیج بننے وقت۔ پانچواں: چوتھے پانی کے 2 ہفتے بعد۔	ٹوکا، سفید مکھی، ملی بگ تیلہ، لشکری سنڈی، امریکن سنڈی، چور کیرا،	جڑیا تنے کی سڑن، پھول یا بیج کی سڑن، پتوں کا جھلساؤ، روئیں دار چھوہندی سفونی چھوہند	پھول کی پشت زرد ہونا، پتیاں بادامی ہو جائیں، گہائی کریں، دھوپ میں سکھائیں۔	نمی کا تناسب 8 فی صد سے زیادہ نہ ہو، خشک اور صاف جگہ پر ذخیرہ کریں۔
<b>تل</b>	ہلکی ریتلی، درمیانی میرا زمین۔ بارش کے بعد دو بار مل + سہاگہ	15-31 جولائی	تل 89، TS-3، S17، HS P-37-40	2 کلوگرام	ٹریکٹر ڈرل قطاروں کا فاصلہ: 60 تا 45 سینٹی میٹر پودوں کا فاصلہ: 10 تا 15 سینٹی میٹر بیج کی گہرائی: 2 انچ	(بوقت کاشت) 1 بوری DAP + 0.5 بوری یوریا پہلی آپاشی پر 0.5 بوری یوریا	پہلا پانی: آگاؤ کے 15-20 دن بعد دوسرا پانی: 20-25 دن بعد تیسرا پانی: پھول آنے پر چوتھا پانی: حسب ضرورت	سفید مکھی، تل کی مکھی، پتہ لپیٹ سنڈی، تل ماتھ	چھوہندی، جرا جھلساؤ، جڑ کا سوکھا۔	نمی کا تناسب 8 فی صد سے کم ہو۔	پک کر تیار، پھلیاں اور پودا تین چوتھائی زرد ہو، دھوپ میں خشک کریں، گہائی کریں، دھوپ میں سکھائیں۔
<b>زیتون</b>	گہرا مل، 2x2x2 فٹ کے گڑھے کھودیں، 1/3 بالائی مٹی علیحدہ کریں، گڑھے دو ہفتے تک کھلے چھوڑیں، بالائی مٹی دو حصے + گوبر کی گلی سڑی کھاد ملا کر گڑھے میں ڈال دیں۔ 2-3 ہفتے بعد پودے لگائیں	وسط فروری تا مارچ یا مون سون کے بعد (اگست تا ستمبر)	باری زیتون 1، باری زیتون 2، فرانتو، کورائیک، کالاماتا، چکوٹی، کورالینا، آریکونو، لیسیو۔	110 پودے فی ایکڑ، قطاروں کا فاصلہ: 22 فٹ، پودوں کا فاصلہ: 18 فٹ، بذریعہ پیوندکاری کی صورت میں پیوند کار کاشت کے وقت زمین کے باہر ہو۔	50 گرام یوریا پودہ پہلے سال استعمال کریں۔ دوسرے سال 50 گرام یوریا + 50 گرام DAP فی پودا ڈالیں۔ ہر سال اس کی مقدار اس کے حساب سے بڑھاتے جائیں۔	چار سال تک کے پودوں کو 15-10 دن کے وقفے سے آپاشی کریں، پھل بننے کے بعد اور پھل پکنے سے ایک ماہ قبل آپاشی ضرور کریں۔	کیمیائی انسداد اور گوڈی سے زیتون کی مکھی، وولی ایفڈ	تیلہ، بارک پٹیل، زیتون کی مکھی، وولی ایفڈ	لیف سپاٹ، کنکر، بیکٹیریئل راث۔	پھل کارنگ آدھا جامنی اور آدھا سبز ہو یعنی موسم خزاں کے آخر میں۔	ٹوکریوں میں رکھ کر 24 گھنٹوں میں تیل نکالنے کے لئے مناسب جگہ لے جائیں۔
<b>سویا بین</b>	زرخیز میرا زمین، 2 بار مل + سہاگہ	خزاں فصل: مئی تا جون، بھاری فصل: 15 فروری تا 15 مارچ	NARC-1، سوات-81، NARC-2، فیصل آباد-83، فیصل آباد-84، ملاکنڈ-94	30-40 کلوگرام	ڈرل بھاریہ۔ قطاروں کا فاصلہ: 30 سینٹی میٹر، خزاں۔ قطاروں کا فاصلہ: 45 سینٹی میٹر، پودوں کا فاصلہ: 3 تا 5 سینٹی میٹر، بیج کی گہرائی: 5-7 سینٹی میٹر۔	بوقت کاشت: 1 بوری DAP + 1 بوری پوناش + 1/2 بوری یوریا پھول کھلنے سے پہلے 1/2 بوری یوریا	پہلی گوڈی پہلے پانی کے بعد، دوسری گوڈی دوسرے پانی کے بعد۔	جراثیمی جھلساؤ، سننے کی سڑن، پتوں کا جھلساؤ، روئیں دار چھوہندی۔	تیار، پتے زرد ہو جائیں، پھلیاں زرد یا کھتر بھوری ہو جائیں۔ نمی 15 فی صد ہو، خشک کریں، گہائی کریں۔	بیج میں نمی 8 فی صد سے کم ہو	
<b>مونگ پھلی</b>	ریتلی میرا زمین، بارش کے بعد مل + سہاگہ تخم کو چھوہند کش زہر لگائیں۔	یکم تا 30 اپریل بارش کی کمی کی صورت میں مئی کے آخر تک۔	باری 2000، باری 2011، باری 2016، بارڈ 499، پٹوہار 2007	50 کلوگرام پھلی 30 کلوگرام گریاں	پورا یا ڈرل قطاروں کا فاصلہ: 75 تا 60 سینٹی میٹر پودوں کا فاصلہ: 20 تا 25 سینٹی میٹر بیج کی گہرائی: 5-7 سینٹی میٹر	(بوقت کاشت)، 1 بوری DAP، 0.5 بوری پوناش پہلی آپاشی: 0.5 بوری یوریا۔ پھول آنے پر 200 کلوگرام جیسیم فی ایکڑ استعمال کریں۔	پہلا پانی: 4-3 ہفتے بعد، دوسرا پانی: پھول آنے پر۔	سفید مکھی، ٹوکا، بالدار سنڈی، دیمک۔	جڑیا تنے کی سڑن، پھلی کی سڑن، ڈاؤنی اور پاؤڈری ملڈیو، لیف سپاٹ، کالراٹ، پودوں کی سیاہ دھبے والی بیماری، بیج کی چھوہندی	پتے خشک ہو کر گرنا شروع ہو جائیں۔ پھلیوں کے چھلکے کا اندرونی حصہ گہرے بھورے رنگ کا ہو جائے، گریاں گلانی ہو جائیں، چھلکا سخت ہو، 40-45 فی صدی ہو، خشک کریں۔	نمی کا تناسب 8 فی صد سے کم ہو۔

تیل دار فصلات میں کیڑوں، بیماریوں اور جڑی بوٹیوں کے بوقت تدارک کیلئے اپنے علاقے کے قریبی زراعت دفتر سے رجوع کریں یا مزید معلومات کیلئے کال سنٹر نمبر 03481117070 پر رابطہ کریں۔  
 شائع کردہ: بیورو آف ایگریکلچر انفارمیشن محکمہ زراعت شعبہ توسیع خیبر پختونخوا ایشیاور